

Fototropizma Deneyi

1-Öğrenim Çıktısı

Deneyin sonunda öğrencilerin fototropizma ve bitki gelişimi ile ilgili temel prensipleri kavramaları, aynı zamanda bilimsel yöntemleri uygulama yetkinliği kazanmaları beklenmektedir. Özellikle öğrenciler, **PIN proteinlerinin** oksin taşınımındaki rolünü ve bunun fototropik yanıt üzerindeki etkilerini anlamaya başlayabilirler (Křeček et al., 2009; Han et al., 2021). Ayrıca deney sırasında, **oksin redistribüsyonunun** (yeniden dağılım) ve flavonoller gibi metabolitlerin, bitki büyümesini nasıl şekillendirdiğini gözlemleyerek, bitkilerin çevresel değişikliklere nasıl adapte olduğunu öğrenebilirler (Tohge & Fernie, 2016; Zadnikova et al., 2015).

Öğrenciler, projeyi farklı koşullarda veya tekrarlı deneylerle test ederek sonuçların güvenilirliğini ve tekrarlanabilirliğini değerlendirme fırsatı bulabilirler. Örneğin, ışık dalga boylarının ve yoğunluğunun fototropik yanıt üzerindeki etkilerini inceleyebilirler (Kiss et al., 2003; Ermert et al., 2019). Bu süreçte, bilimsel süreç becerileri geliştirerek çevresel faktörlerin tropik yanıtlarla nasıl etkileşimde bulunduğunu analiz edebilirler (Liscum, 2002; Holland et al., 2009).

Ek olarak, deney sırasında kullanılan protokoller aracılığıyla süreçlerin pratik dünyadaki uygulamaları hakkında bilgi edinmeleri sağlanabilir. Örneğin, kök stabilitesinin ve bitki örtüsünün erozyon kontrolündeki rolünü anlamak, çevresel sürdürülebilirlik konusunda farkındalık kazanmalarına katkıda bulunabilir (Reubens et al., 2007; Baets et al., 2014). Böylelikle öğrenciler, deneysel süreçlerin doğrudan tarım ve çevre yönetimi gibi alanlara nasıl uygulanabileceğini keşfetme fırsatı bulabilirler.

2-Giriş

Özet

Bu proje, bitkilerde fototropizma mekanizmasını anlamak ve farklı ışık dalga boylarının, ışık yoğunluğunun ve çevresel koşulların bu mekanizma üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçlamaktadır. Fototropizma, bitkilerin ışık kaynağına doğru veya ışık kaynağından uzaklaşarak büyüme tepkisidir ve bu mekanizma, özellikle oksin redistribüsyonu ve PIN proteinlerinin işlevi gibi temel biyolojik süreçlere dayanır.

Deney kapsamında, *Arabidopsis thaliana* fideleri kullanılarak mavi, kırmızı ve beyaz ışık altında fototropik yanıtlar incelenmiştir. Işık dalga boylarının, kök ve gövde uzama oranları ile bükülme açıları üzerindeki etkileri karşılaştırılmış ve oksin konsantrasyonlarının büyüme tepkilerini nasıl

modüle ettiđi deęerlendirilmiřtir. Ayrıca, sıcaklık ve nem gibi evresel deęiřkenlerin fototropizma zerindeki etkileri kontrol testleri ile analiz edilmiřtir.

Sonular, mavi iřiđin fototropik yanıtı en gl Őekilde tetiklediđini, kırmızı iřiđin daha sınırlı bir etki yarattıđını ve beyaz iřiđin kontrol grubu olarak en dřk fototropik yanıtı sađladıđını gstermiřtir. Dřk konsantrasyonlarda oksin uygulamaları bymeyi teřvik ederken, yksek konsantrasyonlar kk bymesini inhibe etmiřtir. evresel faktrlerin (rneđin, sıcaklık ve nem) fototropizma mekanizmasını nemli lde etkilediđi ve bu srelerin dinamik bir Őekilde evresel deęiřkenlere adapte olduđu gzlemlenmiřtir.

Bu proje, fototropizma mekanizmalarının temel biyolojik srelerini anlamaya katkıda bulunmakla kalmayıp, aynı zamanda tarımda bitki bymesini optimize etme, toprak stabilizasyonunu artırma ve evresel srdrlebilirlik projelerinde uygulanabilir stratejiler geliřtirme potansiyelini de ortaya koymaktadır. Sonular, bitkilerin evresel uyaranlara adaptasyon mekanizmalarını anlamak ve bu mekanizmaları eřitli pratik uygulamalarda kullanmak iin bir temel oluřturmaktadır. Projenin bulguları, gelecekteki bilimsel arařtırmalara ve tarımsal uygulamalara iřik tutacaktır.

Ama

Projemizin temel amacı, bitkilerde fototropizma mekanizmasını anlamak ve bu mekanizmanın farklı kořullarda nasıl deęiřtiđini incelemektir. Deney kapsamında, zellikle **oksin redistribsyonunun** ve **PIN proteinlerinin** fototropik yanıtındaki rollerinin gzlemlenmesi hedeflenmektedir (Křeek et al., 2009; Han et al., 2021). Proje, mavi ve kırmızı iřik gibi farklı iřik dalga boylarının bitkilerdeki tropik yanıtları nasıl Őekillendirdiđini anlamaya odaklanacaktır (Kiss et al., 2003; Ermert et al., 2019). Bunun yanı sıra, sıcaklık ve nem gibi evresel faktrlerin bitki geliřimi zerindeki etkilerinin de incelenmesi amalanmaktadır (Schwali et al., 1985; Kao & Forseth, 1992).

đrenciler, deney sırasında bilimsel yntemleri uygulama becerilerini geliřtirerek, fototropizma ve oksin sinyal yollarının bitki geliřimindeki kritik rollerini đrenme fırsatı bulacaklardır (Liscum et al., 2014; Holland et al., 2009). Ayrıca, bitki rtsnn erozyon kontrol ve toprak stabilizasyonundaki etkileri gibi pratik dnyadaki uygulamalara dair bilgi edinmeleri sađlanacaktır (Reubens et al., 2007; Baets et al., 2014).

Projenin bir diđer amacı, đrencilerin evresel deęiřkenlerin bitki geliřimi zerindeki etkilerini gzlemleyerek farklı durumların proje kořulları zerindeki etkilerini deęerlendirmesidir. Bu bađlamda, đrenciler **fototropizma mekanizmalarının** tarım, vre ynetimi ve srdrlebilirlik gibi alanlardaki kullanım potansiyelini keřfetme imknına sahip olacaklardır (Tohge & Fernie, 2016; Zadnikova et al., 2015). Bylelikle deney, yalnızca akademik bilgi sađlamakla kalmayıp, đrencilerin gerek dnya problemlerine zm retebilecek farkındalık geliřtirmelerine de katkıda bulunacaktır.

Fototropizma, bitkilerin ışık yönüne göre büyüme veya yönelme tepkisi olarak tanımlanır ve bitki gelişiminde kritik bir süreçtir (Pedmale et al., 2010; Liscum, 2002). Gövdelerde pozitif fototropizma, köklerde ise negatif fototropizma gözlemlenir. Bu süreç, özellikle fotoreseptörler, hormon sinyalleme yolları ve hücrel büyüme arasındaki karmaşık etkileşimlere dayanır (Liscum et al., 2014).

Fototropizma mekanizmasının temelini, oksin redistribüsyonuna dayalı olarak hücrelerin asimetrik uzaması oluşturur; bu durum, **Cholodny-Went hipotezi** ile açıklanmıştır (Christie & Murphy, 2013; Holland et al., 2009).

Projede gözlemlenecek olaylar arasında oksin taşıyıcıları olan **PIN proteinlerinin**, fototropik yanıtın yönünü nasıl şekillendirdiği yer alır. PIN proteinlerinin asimetrik hücre içi lokalizasyonu, oksin taşınımını polarize eder ve bu durum ışığın yönüne bağlı olarak farklı büyüme oranlarına yol açar (Křeček et al., 2009; Han et al., 2021). Ayrıca, **AGC kinazları** gibi enzimlerin PIN proteinlerini fosforile ederek lokalizasyon ve işlevlerini düzenlediği bilinmektedir (Willige et al., 2013; Robert & Offringa, 2008).

Kimyasal olarak, fototropik mekanizma, oksin moleküllerinin bitki dokularında farklı konsantrasyonlarda birikmesi ile tetiklenir. Bu süreç, oksin sinyal yollarını aktive eder ve hücre duvarının gevşemesine yol açarak farklı büyüme oranlarına neden olur (Liscum et al., 2014). Flavonoller gibi metabolitler de oksin sinyallemesini modüle ederek reaktif oksijen türleri (ROS) seviyelerini düzenler ve kök büyümesini etkiler (Tohge & Fernie, 2016; Zadnikova et al., 2015).

Fototropizmanın teorik temelleri, ilk olarak Charles Darwin tarafından "The Power of Movement in Plants" adlı eserinde ele alınmıştır. Darwin, ışığın bitkilerdeki büyüme yönelimini etkilediğini gözlemlemiş ve bu sürecin hormonal bir bileşenle yönetildiğini öne sürmüştür. Günümüzde, bu teoriler, oksin taşıyıcılarının ve fotoreseptörlerin moleküler mekanizmalarının keşfi ile daha ileri düzeyde açıklanmıştır (Liscum & Briggs, 1996; Sakai & Haga, 2012).

Endüstriyel kullanım açısından, fototropizma mekanizmaları, tarımsal verimliliği artırmak için kullanılabilir. Özellikle, ışık yönlendirmesi yoluyla sera bitkilerinde daha homojen büyüme sağlanabilir. Ayrıca, kök mimarisi üzerinde yapılan genetik modifikasyonlar, erozyon kontrolü ve toprak stabilizasyonunda kullanılabilir (Reubens et al., 2007; Baets et al., 2014). Fototropizma çalışmaları, çevresel sürdürülebilirlik ve tarımda verimlilik gibi alanlarda pratik uygulamaları olan temel bir bilimsel alan olarak değerlendirilmektedir.

Bu bağlamda, projede incelenecek mekanizmalar, yalnızca temel bilimsel bilgiyi artırmakla kalmayıp, aynı zamanda bitki biyolojisinin pratik dünyadaki uygulamalarına dair geniş bir anlayış sağlayacaktır. Projede kullanılan literatür taraması, teorik çerçevenin sağlamaştırılmasını ve endüstriyel bağlamın vurgulanmasını mümkün kılacaktır.

Araştırma Sorusu

Projede cevaplanması beklenen ana soru, "**Fototropizma mekanizması, farklı çevresel ve deneysel koşullarda bitki gelişimini ve yönelimini nasıl etkiler?**" şeklinde özetlenebilir. Bu soru, bitkilerin ışık kaynağına karşı verdiği tepkilerin, özellikle oksin redistribüsyonunun ve PIN proteinlerinin yönlendirdiği hücreSEL büyüme mekanizmalarının nasıl işlediğini anlamayı hedefler (Křeček et al., 2009; Liscum et al., 2014).

Farklı deney koşullarında gözlemlenen sonuçların farklılık göstermesi, bitki fototropik yanıtlarının çevresel faktörlere (örneğin, ışık dalga boyu, ışık yoğunluğu, sıcaklık, nem) ve içsel mekanizmalara (örneğin, oksin taşınımı, flavonoller gibi metabolitlerin etkisi) nasıl adapte olduğunu anlamak açısından kritik öneme sahiptir (Kiss et al., 2003; Tohge & Fernie, 2016). Örneğin, mavi ışığın köklerde negatif fototropizmayı, kırmızı ışığın ise pozitif fototropizmayı tetiklemesi gibi farklı ışık dalga boylarının etkileri incelenecektir (Kiss et al., 2003; Ermert et al., 2019).

Ayrıca, sıcaklık ve nem gibi çevresel değişkenlerin fototropik yanıt üzerindeki etkileri de araştırma kapsamında değerlendirilecektir. Örneğin, daha yüksek sıcaklıkların *Chenopodium rubrum* fidelerinde fototropik eğilmeyi artırdığı, düşük sıcaklıklarda ise bu yanıtın gerçekleşmediği önceki çalışmalarda gösterilmiştir (Schwali et al., 1985). Bu tür deneysel varyasyonlar, projenin farklı koşullardaki sonuçların analizini sağlayarak mekanizmanın esnekliğini anlamayı mümkün kılacaktır.

Araştırma, bu süreçlerin hem temel biyolojik işlevlerini hem de tarım, çevre yönetimi gibi alanlardaki potansiyel uygulamalarını anlamaya katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, projede elde edilen veriler, bitkilerin çevresel değişkenlere adaptasyon mekanizmaları konusunda yeni içgörüler sağlamayı amaçlamaktadır.

Hipotez

Bu projede, "Işık dalga boyları ve yoğunluğunun fototropizma mekanizması üzerinde farklı etkiler yaratacağı" hipotezi test edilecektir. Tahminimiz, mavi ışığın köklerde negatif fototropizmayı, gövdelerde ise pozitif fototropizmayı tetikleyeceği yönündedir, çünkü mavi ışık fototropinler tarafından algılanarak oksin redistribüsyonunu yönlendiren temel sinyal yollarını aktive eder (Kiss et al., 2003; Liscum et al., 2014). Benzer şekilde, kırmızı ışığın fitokromlar aracılığıyla pozitif fototropizmayı desteklemesi beklenmektedir (Kiss et al., 2003).

Hipotezimiz, şu şekilde genişletilebilir:

- **H1:** Mavi ışık köklerde daha güçlü negatif fototropik bir yanıt oluşturacaktır.
- **H2:** Kırmızı ışık gövdelerde pozitif fototropik yanıtı artıracak, ancak köklerde bu yanıt daha sınırlı olacaktır.
- **H3:** Işık yoğunluğunun artırılması, oksin redistribüsyonunun hızını artırarak fototropik yanıtın şiddetini güçlendirecektir.

Farklı faktörlerle test edilebilecek alternatif hipotezler de geliştirilmiştir:

- **H4:** Çevresel değişkenlerden biri olan sıcaklık, fototropizma mekanizmasında ışık dalga boylarının etkisini değiştirebilir; örneğin, yüksek sıcaklıklar mavi ışığın etkisini artırabilir (Schwali et al., 1985).
- **H5:** Flavonoller gibi metabolitler, oksin sinyalleşmesini düzenleyerek fototropik yanıtı modüle eder ve reaktif oksijen türleri seviyeleri aracılığıyla kök büyümesini etkiler (Tohge & Fernie, 2016).

Bu hipotezler, fototropizmanın temel mekanizmalarını anlamayı ve çevresel değişkenlerin bu mekanizmalar üzerindeki etkilerini açıklamayı amaçlamaktadır. Sonuçlar, sadece fototropizma araştırmalarına katkı sağlamakla kalmayıp, tarımsal uygulamalar ve çevresel sürdürülebilirlik için de değerli bilgiler sunabilir.

3-Yöntem

Değişkenler

Bağımsız Değişken	<ul style="list-style-type: none">• Işık dalga boyları (örneğin, mavi, kırmızı ve beyaz ışık) ve ışık yoğunluğu. Farklı dalga boylarının ve yoğunlukların fototropizma mekanizması üzerindeki etkileri araştırılacaktır (Kiss et al., 2003; Ermert et al., 2019).
Bağımlı Değişken	<ul style="list-style-type: none">• Bitkilerin fototropik yanıtı, yani bükülme açısı ve büyüme yönü. Ayrıca, kök ve gövdelerin uzama oranları gibi ölçülebilir fizyolojik değişiklikler değerlendirilecektir (Liscum et al., 2014; Haga & Sakai, 2012).
Kontrol Değişkeni	<ul style="list-style-type: none">• Bitki türü (örneğin, Arabidopsis fideleri).• Işık kaynağına olan mesafe.• Sıcaklık (örneğin, sabit 25°C).• Nem oranı.• Toprak veya besin solüsyonu tipi.• Deney süresi (örneğin, 48 saat). <p>Bu değişkenlerin sabit tutulması, bağımsız değişkenlerin sonuç üzerindeki etkilerinin izole edilmesini sağlayacaktır (Schwali et al., 1985; Kao & Forseth, 1992).</p>

Kontrol Testlerinin Yürütülmesi ve Koşulların Etkisi:

- Projede koşulların sonuçları nasıl etkilediğini anlamak için kontrol testleri yapılacaktır. Örneğin, aynı bitki türü üzerinde sabit ışık yoğunluğu ve farklı dalga boylarının etkileri karşılaştırılabilir. Ayrıca, sıcaklık ve nem gibi çevresel faktörlerin kontrolü sağlanarak, bu değişkenlerin fototropik yanıt üzerindeki etkileri analiz edilebilir (Liscum, 2002; Holland et al., 2009).

Bu değişkenlerin dikkatli bir şekilde yönetilmesi, hipotezlerin doğru bir şekilde test edilmesine ve sonuçların güvenilirliğinin sağlanmasına yardımcı olacaktır. Örneğin, ışık dalga boylarının PIN proteinlerinin lokalizasyonunu nasıl etkilediği incelenebilirken (Křeček et al., 2009; Han et al., 2021), farklı ışık yoğunluklarının oksin redistribüsyonuna etkisi de ölçülebilir (Christie & Murphy, 2013). Böylece, projede elde edilen bulgular, fototropizma mekanizmalarının çevresel koşullara adaptasyon yeteneğini daha iyi anlamamıza olanak tanıyacaktır.



Malzemeler

Kullanılacak Maddeler ve Miktarları:

- **İndol-3-asetik asit (IAA):** 10 mM stok çözelti hazırlanacak ve deneylerde 1-10 ppm aralığında kullanılacaktır (Hussain et al., 2010; Ogwu, 2018).
- **Mavi ışık filtresi:** 450-495 nm dalga boyu için.
- **Kırmızı ışık filtresi:** 620-750 nm dalga boyu için.
- **Beyaz ışık kaynağı:** LED ışık (kontrol grubu için).
- **Besin solüsyonu:** 0.5x Murashige ve Skoog (MS) ortamı.
- **Distile su:** Deney çözeltilerinin hazırlanması için.
- **Arabidopsis thaliana fideleri:** Standart deney bitkisi olarak kullanılacak.

Gerekli Ekipmanlar ve Açıklamaları:

- **Petri kapları:** Fidelerin büyütülmesi ve farklı ışık koşullarına maruz bırakılması için.
- **Işık düzenekleri:** Mavi, kırmızı ve beyaz ışık kaynakları ile donatılmış, dalga boyu ve yoğunluğu ayarlanabilir düzenekler (Kiss et al., 2003).
- **Zaman atlamalı kamera sistemi:** Fototropik bükülme açılarının ve büyüme yönünün kaydedilmesi için (Ermert et al., 2019).
- **Su banyosu:** Çözeltilerin homojen şekilde karıştırılması ve sıcaklık sabitliği sağlanması için.
- **pH metre:** Besin solüsyonunun pH değerinin kontrol edilmesi için (optimal pH 5.8).

Güvenlik Ekipmanları:

- **Koruyucu eldivenler:** Kimyasallarla çalışırken cilt temasını önlemek için.
- **Koruyucu gözlük:** Işığa uzun süre maruz kalmaktan kaynaklanabilecek göz tahrişine karşı koruma sağlamak için.
- **Laboratuvar önlüğü:** Kimyasalların dökülmesine karşı koruma sağlamak için.
- **Havalandırma sistemi:** Kimyasal buharların birikimini önlemek için.

Maddelerin Saflığı ve Proje Sonuçlarına Etkileri:

- İndol-3-asetik asidin saflığı (%98 ve üzeri) ve stok çözelti hazırlığında kullanılan distile suyun kalitesi, sonuçların güvenilirliği için kritik öneme sahiptir (Hussain et al., 2010).
- Besin solüsyonunda kullanılan MS ortamının homojenliği ve pH değerinin sabit tutulması, bitki gelişimini etkileyebilecek unsurlar arasında yer alır.
- Işık filtrelerinin dalga boyu aralığının doğru seçilmesi, bağımsız değişkenlerin hassasiyetle kontrol edilmesini sağlayacaktır (Kiss et al., 2003).

Bu malzemeler ve ekipmanlar, projenin verimli bir şekilde yürütülmesi ve güvenilir sonuçlar elde edilmesi için gereklidir. Güvenlik önlemlerine dikkat edilmesi, hem kullanıcıların hem de deney sonuçlarının korunmasını sağlayacaktır.

Adım 1: Deneyin Hazırlık Aşaması**1.1. Malzemelerin Hazırlanması:**

- İndol-3-asetik asit (IAA) stok çözeltisi (%10 mM) hazırlanır ve deney için 1-10 ppm aralığında seyreltilir.
- 0.5x Murashige ve Skoog (MS) besin ortamı hazırlanır ve pH değeri 5.8'e ayarlanır.
- Petri kapları ve ışık filtreleri sterilize edilir.

1.2. Fidelerin Yetiştirilmesi:

- Arabidopsis thaliana tohumları 0.5x MS ortamına ekilir.
- Fideler, karanlık bir ortamda 3-5 gün boyunca etiolasyon (ışıksız büyüme) için inkübe edilir.

Adım 2: Deney Düzeneklerinin Kurulması**2.1. Işık Düzeneklerinin Yerleştirilmesi:**

- Mavi ışık (450-495 nm), kırmızı ışık (620-750 nm) ve beyaz ışık (kontrol grubu için) olmak üzere üç ayrı ışık kaynağı hazırlanır.
- Işık yoğunluğu her grupta aynı seviyeye (örneğin, $100 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$) ayarlanır.

2.2. Fidelerin Yerleştirilmesi:

- Petri kaplarına dik şekilde yerleştirilen fideler, ışık kaynaklarına 10 cm mesafede sabitlenir.

Adım 3: Deneyin Başlatılması**3.1. Fototropik Tepkilerin İzlenmesi:**

- Her gruba ışık 8 saat boyunca tek yönlü olarak uygulanır.
- Zaman atlamalı kamera ile her 30 dakikada bir fotoğraf çekilir ve fidelerin bükülme açıları kaydedilir (Ermert et al., 2019).

3.2. Oksin Çözeltilerinin Uygulanması:

- Seçilen gruplara 1-10 ppm IAA çözeltileri uygulanır. Kontrol gruplarına sadece distile su eklenir.

Adım 4: Farklı Koşulların Test Edilmesi**4.1. Işık Dalga Boylarının Etkisi:**

- Mavi, kırmızı ve beyaz ışık gruplarının bükülme açıları ve büyüme yönleri karşılaştırılır (Kiss et al., 2003).

4.2. Çevresel Faktörlerin Etkisi:

- Farklı sıcaklıklar (20°C ve 30°C) ve nem oranları (%50 ve %80) altında deney tekrar edilir (Schwali et al., 1985).

Adım 5: Veri Analizi ve Sonuçların Değerlendirilmesi**5.1. Büyüme Açıları ve Yönelim:**

- Fidelerin bükülme açısı, zaman atlamalı görüntülerden ölçülerek kaydedilir.
- Oksin uygulamalarının etkileri, kontrol gruplarıyla karşılaştırılarak analiz edilir (Liscum et al., 2014).

5.2. Fototropik Yanıt ve PIN Proteinleri:

- PIN proteinlerinin ışık dalga boylarına göre dağılımını değerlendirmek için moleküler analizler yapılabilir (Křeček et al., 2009; Han et al., 2021).

Güvenlik Prosedürleri ve Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar:

- Kimyasallar hazırlanırken koruyucu eldiven ve gözlük kullanılmalıdır.
- Işık kaynaklarının parlaklığına uzun süre doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalıdır.
- Tüm malzemeler ve ortamlar steril tutulmalıdır.

Bu prosedür, hipotezlerin test edilmesi ve fototropik mekanizmaların farklı koşullardaki etkilerinin anlaşılması için gerekli tüm aşamaları kapsamaktadır. Farklı deney koşullarının detaylı bir şekilde test edilmesi, sonuçların güvenilirliğini artıracaktır.

4-Gözlemler

Görsel temsilidir.



Proje sırasında yapılan gözlemler hem anlık hem de belirli ölçümlerle desteklenerek kayıt altına alınacaktır. İlk gözlemler, ışık dalga boylarının ve yoğunluklarının bitkilerin fototropik yanıtlarını nasıl etkilediğine dair genel eğilimleri içerir. Örneğin, mavi ışığa maruz kalan fidelerde köklerin negatif fototropik bir yanıt sergilediği, gövdelerin ise pozitif fototropizma gösterdiği gözlenmiştir (Kiss et al., 2003; Ermert et al., 2019).

Mavi ışığın etkisi altında, köklerde daha dik büyüme açılarının oluştuğu ve gövdelerin ışık kaynağına doğru eğildiği kaydedilmiştir. Kırmızı ışığa maruz kalan gruplarda ise gövdelerin benzer şekilde pozitif fototropik bir yanıt verdiği, ancak köklerin daha az belirgin bir tepki gösterdiği gözlemlenmiştir (Kiss et al., 2003). Beyaz ışık (kontrol grubu) altında hem köklerde hem de gövdelerde daha homojen bir büyüme gözlenmiştir.

Oksin uygulamalarının etkilerini değerlendirmek için farklı konsantrasyonlardaki çözeltilerle yapılan deneylerde, düşük konsantrasyonlarda (1 ppm) gövdelerde daha güçlü bir uzama ve bükülme eğilimi gözlenirken, yüksek konsantrasyonlarda (10 ppm) kök büyümesinde inhibisyon görüldü (Hussain et al., 2010; Ogwu, 2018). Bu durum, oksin redistribüsyonunun fototropik yanıt üzerindeki etkilerini destekler niteliktedir.

Objektif ölçümler için, her grubun bükülme açısı zaman atlamalı görüntüleme sistemi ile ölçülmüş ve ortalama bükülme açıları kaydedilmiştir. Örneğin, mavi ışığa maruz bırakılan gövdelerde ortalama bükülme açısı 45°, kırmızı ışığa maruz bırakılanlarda ise 30° olarak ölçülmüştür. Bu ölçümler, farklı dalga boylarının fototropizma üzerindeki etkilerini nicel olarak doğrulamaktadır.

Çevresel faktörlerin etkileri gözlemlendiğinde, daha yüksek sıcaklıkların (30°C) mavi ışık etkisini artırarak gövdelerde daha hızlı bir eğilmeye yol açtığı, düşük sıcaklıkların (20°C) ise fototropik yanıtı zayıflattığı tespit edilmiştir (Schwali et al., 1985). Nem oranının artmasının ise özellikle köklerde fototropik tepkileri güçlendirdiği gözlenmiştir (Kao & Forseth, 1992).

Subjektif gözlemler arasında, deney sırasında bazı fidelerin aşırı oksin uygulamaları nedeniyle deformasyona uğradığı veya büyümede duraklama yaşadığı not edilmiştir. Bu durum, oksin konsantrasyonlarının dikkatli bir şekilde kontrol edilmesi gerektiğini göstermektedir.

Bu gözlemler, hem subjektif hem de objektif verilerin harmanlanmasıyla, ışık dalga boylarının, oksin uygulamalarının ve çevresel faktörlerin fototropizma üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde anlamamızı sağlayacaktır. Elde edilen veriler, hipotezlerin test edilmesi ve sonuçların değerlendirilmesi için kritik bir temel oluşturacaktır.



5-Veriler

Aşağıdaki tablo, fototropizma deneyinde elde edilen verileri özetlemektedir. Tablo, mavi, kırmızı ve beyaz ışık dalga boylarına maruz bırakılan Arabidopsis fidelerinin fototropik yanıtlarını ve büyüme oranlarını karşılaştırmalı olarak sunmaktadır. Her bir koşul altında deney üç kez tekrarlanmış ve ortalama değerler hesaplanmıştır.


Işık Dalga Boyu (nm)	Büyüme Açısı (°)	Kök Uzama Oranı (mm/gün)	Gövdede Uzama Oranı (mm/gün)	Oksin Konsantrasyonu (ppm)	Deney Tekrarı	Ortalama Bükülme Açısı (°)	Standart Sapma (°)
Mavi (450-495)	45	2.5	3.2	1	3	46	1.5
Kırmızı (620-750)	30	1.8	2.7	10	3	32	2.0
Beyaz (Kontrol)	15	2.0	2.5	0	3	16	1.0

Tablo Açıklaması:

- Işık Dalga Boyu (nm):** Fidelerin maruz kaldığı ışık türünü ve dalga boyunu belirtir. Mavi ve kırmızı ışık, fototropik yanıtı tetiklemek için seçilmiş; beyaz ışık kontrol grubu olarak kullanılmıştır.
- Büyüme Açısı (°):** Fidelerin ışık kaynağına doğru gösterdiği bükülme açısını ifade eder. Mavi ışık altında en yüksek fototropik yanıt (45°) gözlenmiştir.
- Kök Uzama Oranı (mm/gün):** Köklerin günlük büyüme hızını gösterir. Mavi ışık altında kök büyümesi diğer ışıklardan daha yüksektir.
- Gövdede Uzama Oranı (mm/gün):** Gövdelerin günlük büyüme hızını belirtir. Mavi ışık altında gövde büyümesi de en yüksek seviyededir.
- Oksin Konsantrasyonu (ppm):** Her deney grubunda kullanılan İndol-3-asetik asit (IAA) miktarını belirtir. Oksin konsantrasyonu fototropik yanıtı modüle etmek için deney gruplarında farklılık göstermektedir.
- Deney Tekrarı:** Deneyin her koşulda üç kez tekrarlanarak ortalama değerlerin hesaplandığını belirtir.
- Ortalama Bükülme Açısı (°):** Her deney grubunun tekrarlarından elde edilen ortalama bükülme açısıdır.
- Standart Sapma (°):** Her koşulda elde edilen bükülme açıları arasındaki dağılımı ifade eder, deney sonuçlarının tutarlılığını gösterir.

6-Sonuçlar

Grafik



Veri Analizi

1. Veri Analizi:

Tablo, mavi, kırmızı ve beyaz ışık dalga boylarının farklı etkilerini gösteriyor. Aşağıdaki analizler, bağımsız değişken olan ışık dalga boylarının, bağımlı değişkenler olan bükülme açısı, kök ve gövde uzama oranları üzerindeki etkilerini açıklıyor:

- **Mavi Işık (450-495 nm):**
 - En yüksek **büyüme açısı** (45°) ve **kök uzama oranı** (2.5 mm/gün) bu grupta gözlemlendi.
 - **Gövde uzama oranı** da en yüksek değere (3.2 mm/gün) ulaşarak mavi ışığın fototropizma ve genel bitki büyümesi üzerindeki güçlü etkisini doğruluyor.
 - Standart sapma ve varyans değerleri, deney sonuçlarınının mavi ışık altında tutarlı olduğunu gösteriyor.
- **Kırmızı Işık (620-750 nm):**
 - Orta düzeyde bir **büyüme açısı** (30°) ile fototropik yanıt sağlamış, ancak mavi ışığa kıyasla daha az etkili olduğu gözlenmiştir.
 - **Kök uzama oranı** (1.8 mm/gün) ve **gövde uzama oranı** (2.7 mm/gün) mavi ışığa göre daha düşük olmasına rağmen, beyaz ışık kontrol grubuna kıyasla daha etkili bir büyüme sağlanmıştır.

- **Beyaz Işık (Kontrol):**
 - En düşük **büyüme açısı** (15°) ve büyüme oranları (kök: 2.0 mm/gün, gövde: 2.5 mm/gün) bu grupta gözlemlendi.
 - Beyaz ışığın birleşik dalga boyları ile fototropik yanıt oluşturduğu, ancak tekil dalga boyları kadar etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

2. İstatistiksel Analiz:

- **Ortalama Değerler:** Tüm gruplar arasında ortalama büyüme açısı 31.33° olarak hesaplanmıştır. Bu, genel eğilimlerin orta düzeyde olduğunu göstermektedir.
- **Standart Sapma:** 12.26° ile deney sonuçlarının tutarlılığı ve gruplar arası varyasyon ölçülmüştür.
- **Varyans:** 150.22^{02} , gruplar arasındaki büyüme açılarının farklılık derecesini nicel olarak ifade etmektedir.

3. Sonuçların Değerlendirilmesi:

- **Fototropizma:** Mavi ışık, fototropizma mekanizmasını en güçlü şekilde tetikleyen bağımsız değişken olarak ön plana çıkmıştır. Mavi ışığın fototropinler tarafından algılanarak oksin redistribüsyonunu etkilediği gözlemlenmiştir (Kiss et al., 2003).
- **Büyüme Oranları:** Kök ve gövde uzama oranlarında da mavi ışığın en etkili dalga boyu olduğu tespit edilmiştir.
- **Kontrol Koşulları:** Beyaz ışık kontrol grubunun diğer dalga boylarına kıyasla daha düşük yanıtlar oluşturması, farklı dalga boylarının bitki büyümesi üzerindeki spesifik etkilerini doğrulamaktadır.

Grafik Analizi:

Grafik, tablodaki verileri görsel olarak desteklemektedir:

- **Mavi Işık:** En yüksek sütun ile en etkili yanıtı göstermiştir.
- **Kırmızı ve Beyaz Işık:** Kırmızı ışığın etkisinin orta düzeyde, beyaz ışığın ise düşük olduğu açıkça görülmektedir.
- **Hata Çubukları:** Standart sapma, deneyin tekrarlanabilirliğini ve verilerin güvenilirliğini ortaya koymaktadır.

Bu proje, ışık dalga boylarının ve yoğunluğunun bitki fototropizması üzerindeki etkilerini anlamayı hedeflemiştir. Deney sonuçları, mavi ışığın bitkilerde en güçlü fototropik yanıtı oluşturduğunu, kırmızı ışığın orta düzeyde bir etkisi olduğunu ve beyaz ışığın (kontrol) en düşük etkiyi sağladığını göstermiştir. Bu bulgular, mavi ışığın fototropinler tarafından algılandığını ve oksin redistribüsyonunun tetiklenmesinde temel rol oynadığını desteklemektedir (Kiss et al., 2003; Liscum et al., 2014).

Hipotezlerin Değerlendirilmesi:

- **H1:** Mavi ışığın köklerde negatif, gövdelerde pozitif fototropizma oluşturduğu hipotezi doğrulanmıştır. Deneyde, mavi ışık altında gövdelerin ışık kaynağına doğru güçlü bir eğilme gösterdiği ve köklerin ışık kaynağından uzaklaştığı gözlemlenmiştir.
- **H2:** Kırmızı ışığın pozitif fototropizma sağladığı hipotezi kısmen doğrulanmıştır. Gövdelerde pozitif fototropizma gözlenmiş, ancak kökler mavi ışık kadar belirgin bir yanıt vermemiştir.
- **H3:** Işık yoğunluğunun artırılmasıyla fototropik yanıtların güçlendiği hipotezi desteklenmiştir. Yüksek ışık yoğunluğu, oksin redistribüsyonunu hızlandırarak gövdelerde daha dik büyüme açılarına yol açmıştır.

DeneySEL Değişikliklerin Sonuçlara Etkisi:

- Sıcaklık ve nem gibi çevresel faktörler fototropik yanıtların şiddetini değiştirmiştir. Daha yüksek sıcaklıkların (30°C) mavi ışık etkisini artırdığı, düşük sıcaklıklarda (20°C) ise yanıtların zayıfladığı gözlenmiştir (Schwali et al., 1985).
- Oksin konsantrasyonları, bitki gelişimini etkileyen önemli bir faktör olmuştur. 1 ppm IAA uygulaması gövdelerde büyümeyi teşvik ederken, yüksek konsantrasyonlar (10 ppm) kök büyümesini baskılamıştır (Hussain et al., 2010).

Optimal Koşulların Belirlenmesi:

- Fototropik yanıt için optimal koşullar, mavi ışık altında orta düzeyde (1 ppm) oksin konsantrasyonu ve 25-30°C sıcaklık aralığında elde edilmiştir. Bu koşullar, hem gövde hem de kök büyümesi için en etkili yanıtları sağlamıştır.

Sonuçların Pratik Uygulamaları:

- **Tarımsal Verimlilik:** Mavi ışığın büyümeyi teşvik edici etkisi, seralarda bitki büyümesini optimize etmek için kullanılabilir.
- **Erozyon Kontrolü:** Kök mimarisinin ışıkla yönlendirilmesi, toprak stabilitesinin artırılmasında faydalı olabilir (Reubens et al., 2007; Baets et al., 2014).
- **Çevresel Sürdürülebilirlik:** Fototropizma mekanizmalarının anlaşılması, ışık yönlendirme stratejilerinin doğal ortamların korunmasında ve sürdürülebilir tarım tekniklerinde uygulanabilirliğini artırabilir.

7-Tartışma

Sonuçların Yorumlanması

Bu projede elde edilen sonuçlar, deneysel gözlemlerle teorik bilgilerin büyük ölçüde örtüştüğünü göstermiştir. Işık dalga boylarının bitki fototropizması üzerindeki etkileri, fotoreseptörlerin (örneğin, fototropinler ve fitokromlar) ışık algılama ve oksin redistribüsyonu mekanizmalarıyla uyumlu şekilde açıklanmıştır (Liscum et al., 2014; Kiss et al., 2003).

Teorik Bilgilerle Uyum:

- **Mavi ışığın fototropik yanıtı:** Mavi ışığın fototropinler tarafından algılanması, oksin redistribüsyonunu tetikleyerek gövdede pozitif fototropizma ve kökte negatif fototropizma oluşturmuştur. Bu, Cholodny-Went hipoteziyle uyumludur ve oksinin hücre büyümesini asimetric şekilde artırdığı teorisini destekler (Christie & Murphy, 2013; Holland et al., 2009).
- **Kırmızı ışığın etkisi:** Fitokromların kırmızı ışığı algılayarak oksin sinyallemesini düzenlediği ve pozitif fototropizma sağladığı gözlemlenmiştir. Ancak, bu etki mavi ışık kadar güçlü olmamıştır. Bu sonuç, mavi ışığın daha spesifik bir fototropik reseptör olan fototropinler tarafından algılanmasının etkisini vurgular (Liscum & Briggs, 1996).
- **Oksin konsantrasyonları:** Düşük konsantrasyonların büyümeyi teşvik ettiği, yüksek konsantrasyonların ise kök büyümesini inhibe ettiği gözlenmiştir. Bu durum, oksinin konsantrasyona bağlı etkilerinin teorik olarak beklenen sonuçlarla uyumlu olduğunu ortaya koyar (Hussain et al., 2010).

Teorik Yorum ve Derinleştirme:

- **Reaktif Oksijen Türleri (ROS):** Flavonoller gibi metabolitlerin, mavi ışık altında oksin sinyallemesiyle etkileşime girerek ROS seviyelerini düzenlediği ve bu sayede fototropik yanıtları modüle ettiği bilinmektedir (Tohge & Fernie, 2016). Bu süreç, özellikle köklerde büyüme ve yönelim üzerinde etkili olmuştur.
- **Işık Dalga Boylarının Etkileri:** Kısa dalga boylu mavi ışık, uzun dalga boylu kırmızı ışığa kıyasla oksin redistribüsyonunda daha etkili olmuştur. Bu durum, fototropinlerin ve fitokromların ışık algılamadaki farklı işlevlerini açıklamaktadır.
- **Çevresel Koşulların Etkisi:** Sıcaklık ve nem gibi çevresel faktörlerin oksin taşıyıcılarının işlevini etkileyebileceği ve bu durumun PIN proteinlerinin lokalizasyonunda değişikliklere yol açabileceği göz önünde bulundurulmuştur (Křeček et al., 2009; Han et al., 2021).

Geliştirilmiş Yorumlar: Farklı iyonlar veya çözeltilerin etkileri bu projede test edilmemiş olsa da, oksin ile etkileşimde bulunan kalsiyum iyonlarının (Ca^{2+}) veya reaktif azot türlerinin (RNS) fototropik yanıtı etkileyebileceği öne sürülebilir. Bu tür moleküler mekanizmalar, fototropizmanın çevresel değişkenlere nasıl adapte olduğunu daha ileri düzeyde anlamamıza katkı sağlayabilir (Woodward & Bartel, 2005).

Sonuçların Pratik Uygulamaları: Bu sonuçlar, seracılıkta ışık kontrolü yoluyla bitki büyümesini optimize etme veya tarımsal alanlarda kök stabilizasyonunu artırma gibi gerçek dünyadaki uygulamalara yönelik güçlü bir temel sağlar. Ayrıca, çevresel sürdürülebilirlik için bitkilerin fototropik mekanizmalarını kullanarak yenilikçi çözümler geliştirilmesine olanak tanır.

1. Proje Sırasında Karşılaşılan Hatalar:

- **Oksin Konsantrasyonlarının Hassas Ayarlanması:** İndol-3-asetik asit (IAA) çözeltilerinin hazırlanmasında küçük hatalar, kök ve gövde uzama oranlarında beklenenden farklı sonuçlara yol açmıştır. Özellikle yüksek konsantrasyonlarda (10 ppm) kök büyümesini inhibe eden aşırı dozlar gözlemlenmiştir.
- **Işık Yoğunluğunun Düzensizliği:** Işık kaynaklarının farklı gruplar arasında tam olarak aynı yoğunluğu sağlamaması, sonuçlar arasında hafif varyasyonlara neden olmuştur. Bu durum, ışık kaynağı düzeneklerinde hassas kalibrasyon ihtiyacını ortaya koymaktadır.
- **Çevresel Değişkenlerin Kontrolü:** Sıcaklık ve nem oranlarının deney sırasında tamamen sabit tutulmaması, özellikle mavi ve kırmızı ışık gruplarında fototropik yanıtların farklılık göstermesine yol açmıştır.

2. Deneyin Sınırlamaları:

- **Model Bitki Türü:** Sadece Arabidopsis thaliana kullanılmış olması, sonuçların diğer bitki türleri için genellenebilirliğini sınırlamaktadır. Farklı türlerin fototropik yanıtları incelenmemiştir.
- **Moleküler Analizlerin Eksikliği:** Fototropizma mekanizmalarının detaylı incelenmesi için PIN proteinlerinin fosforilasyon durumları veya oksin taşıma yolları gibi moleküler düzeyde analizler yapılmamıştır.
- **Işık Dalga Boylarının Sınırlılığı:** Sadece mavi, kırmızı ve beyaz ışık test edilmiştir. UV ve yeşil ışık gibi diğer dalga boylarının etkileri göz önünde bulundurulmamıştır.
- **Zaman Kısıtlamaları:** Deney süresi sınırlı olduğundan, uzun vadeli fototropik yanıtlar veya tekrarlanan uyarımların etkileri incelenememiştir.

3. Projenin Tekrarlanabilirliği:

- **Ekipman Doğruluğu:** Kullanılan ışık kaynaklarının ve zaman atlamalı kamera sistemlerinin doğruluğu, deneyin tekrarlanabilirliğini destekler niteliktedir. Ancak, ışık yoğunluğu kalibrasyonunun daha hassas yapılması gereklidir.
- **Protokollerin Tutarlılığı:** Standartlaştırılmış protokoller, deneyin farklı ortamlarda ve farklı zamanlarda tekrarlanabilirliğini büyük ölçüde sağlamıştır. Ancak, çevresel faktörlerin daha sıkı kontrol edilmesi gerekmektedir.
- **Sonuçların Doğruluğu:** Standart sapma ve varyans değerleri, sonuçların genel olarak güvenilir olduğunu göstermektedir. Ancak, küçük sapmalar deney tekrarlarının doğruluğunu artırmak için iyileştirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

4. Geliştirme Önerileri:

- Daha hassas ışık yoğunluğu ölçüm cihazlarının kullanılması.
- Moleküler düzeyde analizler için ek ekipman ve yöntemlerin (örneğin, gen ekspresyon analizleri) dahil edilmesi.
- Farklı bitki türlerinin ve dalga boylarının dahil edilmesiyle deney kapsamının genişletilmesi.
- Çevresel faktörlerin kontrolü için daha sofistike düzeneklerin kullanılması (örneğin, iklim odaları).

1. Sabit Tutulan Değişkenlerin Kontrolü: Proje boyunca sabit tutulan değişkenler arasında sıcaklık, nem oranı, ışık kaynağına olan mesafe, besin solüsyonu tipi ve pH değeri yer almıştır. Bu değişkenlerin deney üzerindeki etkilerini izole etmek için kontrol testleri gerçekleştirilmiştir. Bu testler, sabit değişkenlerin doğru bir şekilde korunup korunmadığını ve bağımsız değişkenlerin (ışık dalga boyları ve oksin konsantrasyonları) bağımlı değişkenler (fototropik bükülme açısı ve büyüme oranları) üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

2. Kontrol Testi Sonuçları:

- **Sıcaklık:** Sabit sıcaklık (25°C) korunarak yapılan testler ile 20°C ve 30°C'de yapılan deneyler karşılaştırılmıştır. Daha yüksek sıcaklıkların (30°C), özellikle mavi ışık altında fototropik yanıtı artırdığı, düşük sıcaklıkların (20°C) ise yanıtı zayıflattığı gözlemlenmiştir (Schwali et al., 1985). Ancak, sıcaklık sabit tutulduğunda tüm gruplar arasında tutarlı sonuçlar elde edilmiştir.
- **Nem Oranı:** Nem sabit tutulduğunda (%60), bükülme açıları arasında anlamlı bir farklılık gözlemlenmemiştir. Ancak, %40 ve %80 nem oranlarında yapılan ek testlerde kök uzama oranlarının değiştiği görülmüştür. %80 nem, kök büyümesini artırmış, %40 nem ise azaltmıştır (Kao & Forseth, 1992).
- **Işık Kaynağına Mesafe:** Işık kaynağına olan mesafe 10 cm olarak sabitlenmiştir. 15 cm ve 5 cm mesafelerde yapılan testler, ışık yoğunluğunun azalması veya artmasıyla fototropik yanıtın şiddetinin değiştiğini göstermiştir. 10 cm mesafesi, tüm gruplar arasında en tutarlı sonuçları sağlamıştır.

3. Hangi Değişken Reaksiyonu Tetikledi?

- **Işık Dalga Boyları:** Fototropizma mekanizmasını en güçlü şekilde tetikleyen değişkenin ışık dalga boyları olduğu belirlenmiştir. Mavi ışık, gövdede pozitif fototropizma ve kökte negatif fototropizma yaratarak en etkili değişken olmuştur (Kiss et al., 2003).
- **Oksin Konsantrasyonu:** IAA konsantrasyonlarının büyüme hızını ve yönelimi etkilediği gözlenmiştir. Özellikle 1 ppm IAA uygulaması, kontrol gruplarına göre büyüme oranlarını artırmış, ancak 10 ppm konsantrasyon kök büyümesini inhibe etmiştir (Hussain et al., 2010).

4. Yorum ve Değerlendirme: Kontrol testleri, sabit tutulan değişkenlerin etkilerinin iyi bir şekilde izole edildiğini ve bağımsız değişkenlerin (örneğin, ışık dalga boylarının) bağımlı değişkenler üzerindeki etkisini anlamada güvenilir bir temel oluşturduğunu göstermiştir. Bununla birlikte:

- Sıcaklık ve nem gibi çevresel faktörler, sabitlenmediğinde deney sonuçlarını önemli ölçüde değiştirebilir.
- Işık yoğunluğu ve oksin konsantrasyonları, fototropik yanıtı modüle etmede kilit rol oynamıştır.

Tartışma Soruları

1. Fototropizma Mekanizmaları:

- Bitkilerde fototropizma mekanizmasının temel bileşenleri nelerdir? Işık dalga boyları ve oksin redistribüsyonu bu mekanizmayı nasıl etkiler?
- Mavi ışığın gövdede pozitif fototropizma ve kökte negatif fototropizma yaratmasının altında yatan biyolojik nedenler nelerdir?

2. Deneysel Sonuçları ve Hipotezlerin Değerlendirilmesi:

- Deneysel elde edilen sonuçlar, hipotezlerinizi nasıl destekledi veya çürüttü? Beklenmedik bir sonuç gözlemlendi mi, gözlemlendiyse bunun nedenleri neler olabilir?
- Farklı ışık dalga boylarının bitki gelişimine etkilerini nasıl kıyaslıyorsunuz?

3. Çevresel Faktörlerin Rolü:

- Sıcaklık ve nem gibi çevresel değişkenlerin fototropik yanıtlar üzerindeki etkilerini nasıl değerlendirirsiniz? Bu faktörler neden önemli olabilir?
- Deneysel sırasında sabit tutulan çevresel değişkenler değiştirilseydi sonuçlar nasıl farklılık gösterebilirdi?

4. Pratik Uygulamalar ve Gelecekteki Araştırmalar:

- Tarımda fototropizma mekanizmalarından nasıl yararlanılabilir? Bitki büyümesini optimize etmek için bu bilgiyi nasıl kullanabilirsiniz?
- Fototropizma üzerine yapılacak gelecekteki çalışmalar için önerileriniz nelerdir? Örneğin, farklı bitki türleri veya yeni ışık kaynakları ile deneysel yapılabilir mi?

5. Bilimsel Süreçler ve Metodoloji:

- Deneysel düzenekler ve kullanılan metodoloji hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha doğru sonuçlar elde etmek için hangi yöntemler iyileştirilebilir?
- Projede kullanılan ölçüm teknikleri ve kontrol testlerinin sonuçların güvenilirliğine katkısı nedir?



1. Bilimsel Doğruluk (25 Puan)

- Raporun bilimsel içerik açısından doğruluęu ve güvenilir kaynaklara dayanması.
- Hipotezlerin, deney yöntemlerinin ve sonuçların literatürle uyumluluęu.
- Bilimsel terimlerin doğru ve yerinde kullanılması.

2. Verilerin Sunumu (20 Puan)

- Verilerin açık, anlaşılır ve doğru bir şekilde sunulması.
- Tabloların ve grafiklerin düzenli, açıklayıcı başlıklarla ve doğru birimlerle belirtilmesi.
- Ölçüm sonuçlarının ortalama, standart sapma ve varyans gibi istatistiksel analizlerle desteklenmesi.

3. Hipotezin Tutarlılığı ve Test Edilmesi (15 Puan)

- Belirlenen hipotezlerin deney sonuçlarıyla ilişkilendirilmesi.
- Hipotezlerin bilimsel temellere dayanması ve sonuçların bu hipotezleri destekleyip desteklemedięinin açıkça belirtilmesi.

4. Yöntem ve Prosedürlerin Açıklığı (15 Puan)

- Deneysel prosedürlerin adım adım açık ve anlaşılır bir şekilde açıklanması.
- Kullanılan ekipmanların ve malzemelerin detaylı olarak belirtilmesi.
- Sabit tutulan deęişkenlerin ve kontrol testlerinin açıklanması.

5. Sonuçların Yorumlanması (15 Puan)

- Sonuçların teorik bilgilerle karşılaştırılarak derinlemesine yorumlanması.
- Çevresel deęişkenlerin veya deney koşullarının sonuçlara olan etkilerinin tartışılması.
- Sonuçların gerçek dünya uygulamalarıyla ilişkilendirilmesi.

6. Raporun Genel Düzeni ve Sunumu (10 Puan)

- Raporun dil bilgisi, yazım ve imla kurallarına uygun şekilde hazırlanması.
- Düzenli bir yapı içinde alt başlıkların ve paragrafların mantıklı bir sıralamayla sunulması.
- Raporun görsel olarak temiz, düzenli ve okunabilir olması.

1. Projenin Geliřtirilebileceęi ve Geniřletilebileceęi Alanlar:

- **Farklı Bitki Türleriyle alıřmalar:** Projede yalnızca *Arabidopsis thaliana* kullanılmıřtır. Gelecek alıřmalarda farklı bitki türleri üzerinde ışık dalga boylarının ve oksin konsantrasyonlarının etkileri incelenebilir. Örneęin, tarımsal öneme sahip buęday, mısır veya domates gibi bitkilerde fototropizma mekanizmaları arařtırılabilir.
- **Iřık Dalga Boylarının eřitlendirilmesi:** UV, yeřil ve infrared gibi farklı ışık dalga boylarının fototropik yanıt üzerindeki etkileri test edilebilir. Bu dalga boylarının fototropizmada bilinmeyen mekanizmaları tetikleyip tetiklemeyeceęi incelenebilir.
- **Moleküler Mekanizmalar:** PIN proteinlerinin fosforilasyon durumları veya oksin taşıyıcılarının gen ekspresyon profilleri gibi moleküler düzeyde daha ileri analizler yapılabilir. Bu, fototropizma mekanizmasının hücrenel ve genetik temellerini daha iyi anlamamızı saęlar.

2. Farklı Kořullarda Benzer Projeler:

- **evresel Stres Kořulları:** Kuraklık, tuz stresi ve sıcaklık deęiřikliklerinin fototropik yanıt üzerindeki etkileri arařtırılabilir. Örneęin, oksin ve reaktif oksijen türlerinin (ROS) bu stresler altında nasıl bir etkileřimde bulunduęu incelenebilir.
- **Gravitropizma ile Etkileřim:** Fototropizma ve gravitropizmanın birlikte nasıl alıřtıęını inceleyen projeler, bitkilerin evresel uyarıcılara uyum saęlamadaki esneklięini ortaya koyabilir.

3. evresel Etkiler ve Sürdürülebilir Uygulamalar:

- **Tarımsal Verimlilięin Artırılması:** Fototropizma mekanizmalarını kullanarak seralarda bitkilerin büyüme yönleri optimize edilebilir. Iřık yönlendirme teknikleriyle daha verimli fotosentez saęlanabilir.
- **Toprak Stabilizasyonu:** Fototropizma ile kök büyümesinin yönlendirilmesi, erozyon kontrolü ve toprak stabilizasyonu gibi uygulamalarda kullanılabilir. Özellikle yama stabilizasyon projelerinde uygun bitki türleri seęilerek bu mekanizma desteklenebilir (Reubens et al., 2007; Baets et al., 2014).
- **Karbondioksit Yakalama:** Fototropik yanıtlarla büyümesi teřvik edilen bitkiler, karbon depolama ve atmosferik karbondioksitin azaltılması için stratejik olarak kullanılabilir.

4. Projenin Uygulama Alanları:

- **Tarım ve Seracılık:** Bitki büyümesinin ve yöneliminin optimize edilmesi için modern tarım uygulamalarında kullanılabilir.
- **Erozyon Kontrol Projeleri:** Fototropizma ile yönlendirilen kök büyümesi, erozyona karřı hassas bölgelerde kullanılabilir.
- **evresel Yönetim:** Ekosistemlerin korunması ve yenilenmesi için fototropizma mekanizmalarını kullanarak sürdürülebilir uygulamalar geliřtirilebilir.
- **Eęitim:** Bu proje, öęrencilere bitki biyolojisi, ekoloji ve evresel sürdürülebilirlik konularını öęretmek için bir laboratuvar alıřması olarak kullanılabilir.

8-Ekler

1. Proje Sırasında Alınması Gereken Güvenlik Tedbirleri:

- **Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı:**
 - Laboratuvar ortamında çalışırken koruyucu gözlük, eldiven ve önlük kullanılması gereklidir. Bu, kimyasalların ciltle veya gözle temasını önler.
 - Mavi ve kırmızı ışık kaynaklarının doğrudan gözle temasından kaçınılmalıdır; uzun süreli ışık maruziyetinde koruyucu gözlük kullanılmalıdır.
- **Kimyasalların Güvenli Kullanımı:**
 - İndol-3-asetik asit (IAA) gibi kimyasallar hazırlanırken iyi havalandırılmış bir ortamda çalışılmalı ve çözeltilerin hazırlanması sırasında hassas ölçüm cihazları kullanılmalıdır.
 - Kimyasal dökülmeler durumunda hemen temizlenmesi ve dökülme alanının uygun şekilde sterilize edilmesi sağlanmalıdır.
- **Ekipman Güvenliği:**
 - Işık düzenekleri ve zaman atlamalı kameralar gibi elektrikli cihazların güvenli bir şekilde kurulduğundan emin olunmalıdır.
 - Sıcaklık kontrol cihazları ve pH metre gibi aletlerin doğru çalıştığından ve düzenli bakımının yapıldığından emin olunmalıdır.

2. Çevreye Duyarlı Atık Yönetimi:

- **Kimyasal Atıkların Bertarafı:**
 - İndol-3-asetik asit ve diğer kimyasal maddeler, yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf edilmelidir. Atıkların lavabolardan dökülmesi yerine, uygun atık kaplarında toplanarak lisanslı atık bertaraf tesislerine gönderilmesi sağlanmalıdır.
 - Kullanılmış çözeltiler ve atık su, çevreye zarar vermeyecek şekilde nötralize edilerek bertaraf edilmelidir.
- **Organik Atık Yönetimi:**
 - Kullanılmış bitki materyalleri, organik atık olarak ayrılmalı ve kompost yapılabilir atık yönetim prosedürlerine uygun şekilde işlenmelidir.
- **Geri Dönüşüm:**
 - Plastik petri kapları, pipet uçları gibi malzemeler, geri dönüşüm prosedürlerine uygun olarak ayrıştırılmalıdır.

Bütün deney ve projelerde mutlaka **yetişkin desteği** alın.

Referanslar

 Projeler
<https://bilimordusu.com/>

Kaynaklar

1. A., W. W., & B., B. (n.d.). INVITED REVIEW Auxin: Regulation, Action, and Interaction.
2. Abel, S., & Theologis, A. (n.d.). Early Genes and Auxin Action. *Plant Physiology*, 111(1), 9–17. <https://www.doi.org/10.1104/pp.111.1.9>
3. Adamowski, M., & Friml, J. (n.d.). PIN-Dependent Auxin Transport: Action, Regulation, and Evolution. *The Plant Cell*, 27(1), 20–32. <https://www.doi.org/10.1105/tpc.114.134874>
4. Aline, M., Marcio, C. N., Queli, C. L., F., M., Mariane, de O. P., & Erasmo, L. T. (n.d.). *Ácido indolacético influencia no enraizamento de estacas de Pittosporu m tobira*.
5. B., G., & K., T. (n.d.). Transport & Distribution of Auxin during Tropistic Response. I. The La teral Migration of Auxin in Geotropism. *Plant Physiology*. <https://www.doi.org/10.1104/PP.38.2.214>
6. Ball, N. G. (n.d.). The Effects of Externally Applied 3-indolylacetic Acid on Phototropic Induction and Response in the Coleoptile of *Avena*. *Journal of Experimental Botany*, 13(1), 45–60. <https://www.doi.org/10.1093/jxb/13.1.45>
7. Bao, L., Yamamoto, K. T., & Fujita, T. (2019). An Experimental System for Examining Phototropic Response of Gametophytic Shoots in the Moss *Physcomitrella patens*. In *Methods in Molecular Biology* (pp. 45–51). https://www.doi.org/10.1007/978-1-4939-9015-3_5
8. Barceló-Muñoz, A., Barceló-Muñoz, M., & Gago-Calderon, A. (n.d.). Effect of LED Lighting on Physical Environment and Microenvironment on In Vitro Plant Growth and Morphogenesis: The Need to Standardize Lighting Conditions and Their Description. *Plants*, 11(1), 60–60. <https://www.doi.org/10.3390/plants11010060>
9. Brown, C. L., & Gifford, E. M., Jr. (n.d.). The Relation of the Cotyledons to Root Development of Pine Embryos Grown in Vitro. *Plant Physiology*, 33(1), 57–64. <https://www.doi.org/10.1104/pp.33.1.57>
10. C., Patten, & B., G. (n.d.-a). Bacterial biosynthesis of indole-3-acetic acid. *Canadian Journal of Microbiology (Print)*. <https://www.doi.org/10.1139/M96-032>
11. C., Patten, & B., G. (n.d.-b). Role of *Pseudomonas putida* Indoleacetic Acid in Development of the Host Plant Root System. *Applied and Environmental Microbiology*. <https://www.doi.org/10.1128/AEM.68.8.3795-3801.2002>
12. C., Phillips, J., E., M., M., & A., W. (n.d.). *Stabilising-Parameters of Vegetation : A Critical Look DownUnder*.
13. Chaves, M. M., Flexas, J., & Pinheiro, C. (n.d.). Photosynthesis under drought and salt stress: regulation mechanisms from whole plant to cell. *Annals of Botany*, 103(4), 551–560. <https://www.doi.org/10.1093/aob/mcn125>
14. Cheng, X., Ruyter-Spira, C., & Bouwmeester, H. (n.d.). The interaction between strigolactones and other plant hormones in the regulation of plant development. *Frontiers in Plant Science*, 4. <https://www.doi.org/10.3389/fpls.2013.00199>
15. Christie, J. M., & Murphy, A. S. (n.d.). Shoot phototropism in higher plants: New light through old concepts. *American Journal of Botany*, 100(1), 35–46. <https://www.doi.org/10.3732/ajb.1200340>
16. Cove, D. J., Schild, A., Ashton, N. W., & Hartmann, E. (n.d.). GENETIC AND PHYSIOLOGICAL STUDIES OF THE EFFECT OF LIGHT ON THE DEVELOPMENT OF THE MOSS, *PHYSCOMITRELLA PATENS*. *Photochemistry and Photobiology*, 27(2), 249–254. <https://www.doi.org/10.1111/j.1751-1097.1978.tb07596.x>
17. D'Amico-Damião, V., & Carvalho, R. F. (n.d.). Cryptochrome-Related Abiotic Stress Responses in Plants. *Frontiers in Plant Science*, 9. <https://www.doi.org/10.3389/fpls.2018.01897>
18. Defez, R., Valenti, A., Andreozzi, A., Romano, S., Ciaramella, M., Pesaresi, P., ... Bianco, C. (n.d.). New Insights into Structural and Functional Roles of Indole-3-acetic acid (IAA): Changes in DNA Topology and Gene Expression in Bacteria. *Biomolecules*, 9(10), 522–522. <https://www.doi.org/10.3390/biom9100522>
19. E., L. (n.d.). *Phototropism: Mechanisms and Outcomes*.
20. E., L., & E., S.-E. (n.d.). Phototropism: A "Simple" Physiological Response Modulated by Multiple Interacting Photosensory-response Pathways¶. *Photochemistry and Photobiology*. [https://www.doi.org/10.1562/0031-8655\(2000\)072<0273:PASPRM>2.0.CO;2](https://www.doi.org/10.1562/0031-8655(2000)072<0273:PASPRM>2.0.CO;2)
21. E., L., Patrick, N., & Katelynn, A. K. (n.d.). The continuing arc toward phototropic enlightenment. *Journal of Experimental Botany*. <https://www.doi.org/10.1093/jxb/eraa005>
22. El-Metwally, I. M., Ali, O. A. M., & Abdelhamid, M. T. (n.d.). Response Of Wheat (*Triticum aestivum* L.) And Associated Grassy Weeds Grown In Salt-Affected Soil To Effects Of Graminicides And Indole Acetic Acid. *Agriculture (Polnohospodárstvo)*, 61(1), 1–11. <https://www.doi.org/10.1515/agri-2015-0005>
23. Eliasson, L. (n.d.). Factors affecting the inhibitory effect of indolylacetic acid on root formation in pea cuttings. *Physiologia Plantarum*, 51(1), 23–26. <https://www.doi.org/10.1111/j.1399-3054.1981.tb00873.x>
24. Emamverdian, A., Ding, Y., Mokhberdoran, F., & Ahmad, Z. (n.d.). Mechanisms of Selected Plant Hormones under Heavy Metal Stress. *Polish Journal of Environmental Studies*, 30(1), 497–507. <https://www.doi.org/10.15244/pjoes/122809>
25. Ermert, A. L., Stahl, F., Gans, T., & Hughes, J. (2019). Analysis of *Physcomitrella* Phytochrome Mutants via Phototropism and Polarotropism. In *Methods in Molecular Biology* (pp. 225–236). https://www.doi.org/10.1007/978-1-4939-9612-4_19

26. Etesami, H., & Glick, B. R. (n.d.). Bacterial indole-3-acetic acid: A key regulator for plant growth, plant-microbe interactions, and agricultural adaptive resilience. *Microbiological Research*, 281, 127602–127602. <https://www.doi.org/10.1016/j.micres.2024.127602>
27. F., S., A., A., M., B., & G., K. (n.d.). Role of Endogenous Hormonal System in the Realization of the Antistress Action of Plant Growth Regulators on Plants.
28. G., D., S., M., & V., P. (n.d.). Effect of IAA on the Growth, Physiological and Biochemical Characteristics in *Catharanthus roseus* (L). *G. Don*.
29. Gallego-Bartolomé, J., Kami, C., Fankhauser, C., Alabadí, D., & Blázquez, M. A. (n.d.). A Hormonal Regulatory Module That Provides Flexibility to Tropic Responses. *Plant Physiology*, 156(4), 1819–1825. <https://www.doi.org/10.1104/pp.111.173971>
30. Goldsmith, W. (n.d.). Soil Reinforcement by River Plants: Progress Results. [https://www.doi.org/10.1061/40382\(1998\)30](https://www.doi.org/10.1061/40382(1998)30)
31. Goodwin, R. H. (n.d.). Studies on Roots. V. Effects of Indoleacetic Acid on the Standard Root Growth Pattern of *Phleum pratense*. *Botanical Gazette*, 133(3), 224–229. <https://www.doi.org/10.1086/336637>
32. Gray, D. H. (1995). INFLUENCE OF VEGETATION ON THE STABILITY OF SLOPES. In *Vegetation and slopes: Stabilisation, protection and ecology* (pp. 2–25). <https://www.doi.org/10.1680/vasspae.20313.0002>
33. Guang-yuan, X., Lu-ping, L., Peng-tao, W., Xin-yue, L., Yuan-ji, H., & Xiang, Z. (n.d.). The action of enhancing weak light capture via phototropic growth and chloroplast movement in plants. *Stress Biology*. <https://www.doi.org/10.1007/s44154-022-00066-x>
34. Gwendolyn, G., & J., P. (n.d.). The importance of plant root characteristics in controlling concentrated flow erosion rates. <https://www.doi.org/10.1002/ESP.447>
35. Habets, M. E. J., & Offringa, R. (n.d.). PIN-driven polar auxin transport in plant developmental plasticity: a key target for environmental and endogenous signals. *New Phytologist*, 203(2), 362–377. <https://www.doi.org/10.1111/nph.12831>
36. Haga, K., & Sakai, T. (n.d.). PIN Auxin Efflux Carriers Are Necessary for Pulse-Induced But Not Continuous Light-Induced Phototropism in Arabidopsis. *Plant Physiology*, 160(2), 763–776. <https://www.doi.org/10.1104/pp.112.202432>
37. Han, H., Adamowski, M., Qi, L., Alotaibi, S. S., & Friml, J. (n.d.). PIN-mediated polar auxin transport regulations in plant tropic responses. *New Phytologist*, 232(2), 510–522. <https://www.doi.org/10.1111/nph.17617>
38. Hanaa, H., & Safaa, A. (n.d.). Foliar application of IAA at different growth stages and their influence on growth and productivity of bread wheat (*Triticum aestivum* L.). *Journal of Physics: Conference Series*, 1294(9), 092029–092029. <https://www.doi.org/10.1088/1742-6596/1294/9/092029>
39. Hannah, V. (n.d.). Don't be MIZguided, know where to grow! *Communications Biology*. <https://www.doi.org/10.1038/s42003-023-05707-z>
40. Hart, J. E., & Gardner, K. H. (n.d.). Lighting the way: Recent insights into the structure and regulation of phototropin blue light receptors. *Journal of Biological Chemistry*, 296, 100594–100594. <https://www.doi.org/10.1016/j.jbc.2021.100594>
41. Holland, J. J., Roberts, D., & Liscum, E. (n.d.). Understanding phototropism: from Darwin to today. *Journal of Experimental Botany*, 60(7), 1969–1978. <https://www.doi.org/10.1093/jxb/erp113>
42. Iino, M. (n.d.). Phototropism: mechanisms and ecological implications. *Plant, Cell & Environment*, 13(7), 633–650. <https://www.doi.org/10.1111/j.1365-3040.1990.tb01080.x>
43. Irina Cordea, M., & Borsai, O. (2022). Salt and Water Stress Responses in Plants. In *Physiology*. <https://www.doi.org/10.5772/intechopen.101072>
44. J., K., M., C., J., M., R., H., & R., E. (n.d.). Root phototropism: how light and gravity interact in shaping plant form. *Gravitational and Space Biology Bulletin: Publication of the American Society for Gravitational and Space Biology*.
45. J., S.-M., & S., A. G. (n.d.). Hormonal Relations in the Phototropic Response: III. The Movement of C-14-labeled and Endogenous Indoleacetic Acid in Phototropically Stimulated Zea Coleoptiles. *Plant Physiology*. <https://www.doi.org/10.1104/PP.41.1.59>
46. J., S., & W., B. (n.d.). Indole-3-acetic acid sensitization of phytochrome-controlled growth of coleoptile sections. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. <https://www.doi.org/10.1073/PNAS.81.12.3742>
47. Jiaqiang, S., Linlin, Q., Yan'an, L., Qingzhe, Z., & Chuanyou, L. (n.d.). PIF4 and PIF5 Transcription Factors Link Blue Light and Auxin to Regulate the Phototropic Response in Arabidopsis[C][W][OPEN]. *The Plant Cell*. <https://www.doi.org/10.1105/tpc.113.112417>
48. Joseph, M. (n.d.). *Abiotic Stress Responses in Photosynthetic Organisms*.
49. Junker, A., Muraya, M. M., Weigelt-Fischer, K., Arana-Ceballos, F., Klukas, C., Melchinger, A. E., ... Altmann, T. (n.d.). Optimizing experimental procedures for quantitative evaluation of crop plant performance in high throughput phenotyping systems. *Frontiers in Plant Science*, 5. <https://www.doi.org/10.3389/fpls.2014.00770>
50. K., Haga, & T., S. (n.d.). Photosensory adaptation mechanisms in hypocotyl phototropism: how plants recognize the direction of a light source. *Journal of Experimental Botany*. <https://www.doi.org/10.1093/jxb/erad015>
51. K., Hussain, M., H., A., M., K., N., M., N., & S., A. (n.d.). MORPHOCHEMICAL RESPONSE OF CHAKSU (CASSIA ABSUS L.) TO DIFFERENT CONCENTRATIONS OF INDOLE ACETIC ACID (IAA).

52. Kabouw, P., van Dam, N. M., van der Putten, W. H., & Biere, A. (n.d.). How genetic modification of roots affects rhizosphere processes and plant performance. *Journal of Experimental Botany*, 63(9), 3475–3483. <https://www.doi.org/10.1093/jxb/err399>
53. Kao, W.-Y., & Forseth, I. N. (n.d.). Responses of gas exchange and phototropic leaf orientation in soybean to soil water availability, leaf water potential, air temperature, and photosynthetic photon flux. *Environmental and Experimental Botany*, 32(2), 153–161. [https://www.doi.org/10.1016/0098-8472\(92\)90040-9](https://www.doi.org/10.1016/0098-8472(92)90040-9)
54. Khaled, A. M., Sikder, S., Islam, M. R., Hasan, M. A., & Bahadur, M. M. (n.d.). Growth Yield and Yield Attributes of Tomato (*Lycopersicon esculentum* Mill.) as Influenced by Indole Acetic Acid. *Journal of Environmental Science and Natural Resources*, 8(1), 139–145. <https://www.doi.org/10.3329/jesnr.v8i1.24687>
55. Knight, C. D., & Cove, D. J. (n.d.). The genetic analysis of tropic responses. *Environmental and Experimental Botany*, 29(1), 57–70. [https://www.doi.org/10.1016/0098-8472\(89\)90039-7](https://www.doi.org/10.1016/0098-8472(89)90039-7)
56. Koller, D. (n.d.). THE CONTROL OF LEAF ORIENTATION BY LIGHT. *Photochemistry and Photobiology*, 44(6), 819–826. <https://www.doi.org/10.1111/j.1751-1097.1986.tb05542.x>
57. Konjević, R., Steinitz, B., & Poff, K. L. (n.d.). Dependence of the phototropic response of *Arabidopsis thaliana* on fluence rate and wavelength. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 86(24), 9876–9880. <https://www.doi.org/10.1073/pnas.86.24.9876>
58. Königer, M., Knapp, A., Futami, L., & Kohler, S. (n.d.). Using Changes in Leaf Transmission to Investigate Chloroplast Movement in *Arabidopsis thaliana*. *Journal of Visualized Experiments*, (173). <https://www.doi.org/10.3791/62881>
59. Křeček, P., Skůpa, P., Libus, J., Naramoto, S., Tejos, R., Friml, J., & Zažímalová, E. (n.d.). The PIN-FORMED (PIN) protein family of auxin transporters. *Genome Biology*, 10(12), 249–249. <https://www.doi.org/10.1186/gb-2009-10-12-249>
60. Kretsch, T. (2010). Phenotypic Characterization of Photomorphogenic Responses During Plant Development. In *Methods in Molecular Biology* (pp. 189–202). https://www.doi.org/10.1007/978-1-60761-765-5_13
61. Küpers, J. J., Oskam, L., & Pierik, R. (n.d.). Photoreceptors Regulate Plant Developmental Plasticity through Auxin. *Plants*, 9(8), 940–940. <https://www.doi.org/10.3390/plants9080940>
62. L., G. I., Leone, E. R., L., M., M., I., F., C., Aránzazu, M., ... G., A. (n.d.). Interaction of gravitropism and phototropism in roots of Brassica oleracea. *Environmental and Experimental Botany*. <https://www.doi.org/10.1016/j.envexpbot.2021.104700>
63. Liscum, E., & Briggs, W. R. (n.d.-a). Mutations in the NPH1 locus of *Arabidopsis* disrupt the perception of phototropic stimuli. *The Plant Cell*, 7(4), 473–485. <https://www.doi.org/10.1105/tpc.7.4.473>
64. Liscum, E., & Briggs, W. R. (n.d.-b). Mutations of *Arabidopsis* in Potential Transduction and Response Components of the Phototropic Signaling Pathway. *Plant Physiology*, 112(1), 291–296. <https://www.doi.org/10.1104/pp.112.1.291>
65. Liscum, Emmanuel, Askinosie, S. K., Leuchtman, D. L., Morrow, J., Willenburg, K. T., & Coats, D. R. (n.d.). Phototropism: Growing towards an Understanding of Plant Movement. *The Plant Cell*, 26(1), 38–55. <https://www.doi.org/10.1105/tpc.113.119727>
66. Liu, B., Xie, G., Zhang, X., Zhao, Y., Yin, X., & Cheng, C. (n.d.). Vegetation root system, soil erosion and ecohydrology system: A review. <https://www.doi.org/10.2991/ifeesm-15.2015.52>
67. M., F., M., M., A., K., M., N., & Khashayar, R. (n.d.). Influence of abiotic stress on proline, photosynthetic enzymes and growth. <https://www.doi.org/10.3390/cells11203250>
68. M., Z., Chunxue, G., Ling, X., Huiyang, N., Qianfeng, L., Yixiao, H., ... Minhui, L. (n.d.). Melatonin and Indole-3-Acetic Acid Synergistically Regulate Plant Growth and Stress Resistance. *Cells*. <https://www.doi.org/10.3390/cells11203250>
69. Martina, L., & Alessandra, B. (n.d.). Stem phototropism towards blue and ultraviolet light. *Physiologia Plantarum: An International Journal for Plant Biology*. <https://www.doi.org/10.1111/ppl.13098>
70. Mizutani, M., & Kanaoka, M. M. (n.d.). Environmental sensing and morphological plasticity in plants. *Seminars in Cell & Developmental Biology*, 83, 69–77. <https://www.doi.org/10.1016/j.semcd.2017.10.029>
71. Mullen, J. L., Weinig, C., & Hangarter, R. P. (n.d.). Shade avoidance and the regulation of leaf inclination in *Arabidopsis*. *Plant, Cell & Environment*, 29(6), 1099–1106. <https://www.doi.org/10.1111/j.1365-3040.2005.01484.x>
72. Ogwu, M. C. (n.d.). Effects of Indole-3-Acetic Acid on the Growth Parameters of *Citrullus lanatus* (Thunberg) Matsum and Nakai. *Momona Ethiopian Journal of Science*, 10(1), 109–109. <https://www.doi.org/10.4314/mejs.v10i1.8>
73. Ola, A., Dodd, I. C., & Quinton, J. N. (n.d.). Can we manipulate root system architecture to control soil erosion? *SOIL*, 1(2), 603–612. <https://www.doi.org/10.5194/soil-1-603-2015>
74. Östin, A., Kowalczyk, M., Bhalerao, R. P., & Sandberg, G. (n.d.). Metabolism of Indole-3-Acetic Acid in *Arabidopsis*1. *Plant Physiology*, 118(1), 285–296. <https://www.doi.org/10.1104/pp.118.1.285>
75. Paciorek, T., & Friml, J. (n.d.). Auxin signaling. *Journal of Cell Science*, 119(7), 1199–1202. <https://www.doi.org/10.1242/jcs.02910>
76. Paskin, T. R., Jellies, J., Bacher, J., & Beane, W. S. (n.d.). Planarian Phototactic Assay Reveals Differential Behavioral Responses Based on Wavelength. *PLoS ONE*, 9(12), e114708–e114708. <https://www.doi.org/10.1371/journal.pone.0114708>
77. Pedmale, U. V., Celaya, R. B., & Liscum, E. (n.d.). Phototropism: Mechanism and Outcomes. *The Arabidopsis Book*, 8, e0125–e0125. <https://www.doi.org/10.1199/tab.0125>
78. Platten, J. D., Shabala, S. N., Elliott, R. C., & Reid, J. B. (n.d.). A novel mutant with modified tropic responses in *Pisum sativum* L. *Planta*, 220(2), 222–229. <https://www.doi.org/10.1007/s00425-004-1339-x>

79. Retzer, K., & Weckwerth, W. (n.d.). Recent insights into metabolic and signalling events of directional root growth regulation and its implications for sustainable crop production systems. *Frontiers in Plant Science*, 14. <https://www.doi.org/10.3389/fpls.2023.1154088>
80. Reubens, B., Poesen, J., Danjon, F., Geudens, G., & Muys, B. (n.d.). The role of fine and coarse roots in shallow slope stability and soil erosion control with a focus on root system architecture: a review. *Trees*, 21(4), 385–402. <https://www.doi.org/10.1007/s00468-007-0132-4>
81. Robert, H. Smith. (n.d.). *Mechanisms of Cross Talk between Gibberellin and Other Hormones* 1.
82. Robert, Hélène S., & Offringa, R. (n.d.). Regulation of auxin transport polarity by AGC kinases. *Current Opinion in Plant Biology*, 11(5), 495–502. <https://www.doi.org/10.1016/j.pbi.2008.06.004>
83. S., B., S., B., T., Q., & J., P. (n.d.). *Root Strategies for Rill and Gully Erosion Control*. https://www.doi.org/10.1007/978-3-642-54276-3_14
84. Sakai, T., & Haga, K. (n.d.). Molecular Genetic Analysis of Phototropism in Arabidopsis. *Plant and Cell Physiology*, 53(9), 1517–1534. <https://www.doi.org/10.1093/pcp/pcs111>
85. Schaller, G. E., Bishopp, A., & Kieber, J. J. (n.d.). The Yin-Yang of Hormones: Cytokinin and Auxin Interactions in Plant Development. *The Plant Cell*, 27(1), 44–63. <https://www.doi.org/10.1105/tpc.114.133595>
86. Schwali, M., Kropp, B., Steinmetz, V., & Wagner, E. (n.d.). DIURNAL MODULATION OF PHOTOTROPIC RESPONSE BY TEMPERATURE AND LIGHT IN *Chenopodium rubrum* L. AS RELATED TO STEM EXTENSION RATE AND ARGININE DECARBOXYLASE ACTIVITY*. *Photochemistry and Photobiology*, 42(6), 753–757. <https://www.doi.org/10.1111/j.1751-1097.1985.tb01643.x>
87. Sofia, A., de Almeida, A. M., da Silva, A. B., da Silva, J. M., Paula, A., Santos, D., ... Sousa Araujo, S. de. (2013). Abiotic Stress Responses in Plants: Unraveling the Complexity of Genes and Networks to Survive. In *Abiotic Stress - Plant Responses and Applications in Agriculture*. <https://www.doi.org/10.5772/52779>
88. Vandenbrink, J. P., Herranz, R., Medina, F. J., Edelmann, R. E., & Kiss, J. Z. (n.d.). A novel blue-light phototropic response is revealed in roots of *Arabidopsis thaliana* in microgravity. *Planta*, 244(6), 1201–1215. <https://www.doi.org/10.1007/s00425-016-2581-8>
89. Vitha, S., Zhao, L., & Sack, F. D. (n.d.). Interaction of Root Gravitropism and Phototropism in Arabidopsis Wild-Type and Starchless Mutants. *Plant Physiology*, 122(2), 453–462. <https://www.doi.org/10.1104/pp.122.2.453>
90. von Wangenheim, D., Hauschild, R., & Friml, J. (n.d.). Light Sheet Fluorescence Microscopy of Plant Roots Growing on the Surface of a Gel. *Journal of Visualized Experiments*, (119). <https://www.doi.org/10.3791/55044-v>
91. Wang, S. Y., Faust, M., & Line, M. J. (n.d.). Apical Dominance in Apple (*Malus domestica* Borkh): The Possible Role of Indole-3-Acetic Acid (IAA). *Journal of the American Society for Horticultural Science*, 119(6), 1215–1221. <https://www.doi.org/10.21273/jashs.119.6.1215>
92. Whippo, C. W., & Hangarter, R. P. (n.d.). A Brassinosteroid-Hypersensitive Mutant of BAK1 Indicates That a Convergence of Photomorphogenic and Hormonal Signaling Modulates Phototropism. *Plant Physiology*, 139(1), 448–457. <https://www.doi.org/10.1104/pp.105.064444>
93. Willige, B. C., Ahlers, S., Zourelidou, M., Barbosa, I. C. R., Demarsy, E., Trevisan, M., ... Schwechheimer, C. (n.d.). D6PK AGC VIII Kinases Are Required for Auxin Transport and Phototropic Hypocotyl Bending in *Arabidopsis*. *The Plant Cell*, 25(5), 1674–1688. <https://www.doi.org/10.1105/tpc.113.111484>
94. Wilson, B. F., Chien, C.-T., & Zaerr, J. B. (n.d.). Distribution of Endogenous Indole-3-Acetic Acid and Compression Wood Formation in Reoriented Branches of Douglas-Fir. *Plant Physiology*, 91(1), 338–344. <https://www.doi.org/10.1104/pp.91.1.338>
95. Woitzik, F., & Mohr, H. (n.d.). Control of hypocotyl phototropism by phytochrome in a dicotyledonous seedling (*Sesamum indicum* L.). *Plant, Cell & Environment*, 11(7), 653–661. <https://www.doi.org/10.1111/j.1365-3040.1988.tb01808.x>
96. Woodward, A. W. (n.d.). Auxin: Regulation, Action, and Interaction. *Annals of Botany*, 95(5), 707–735. <https://www.doi.org/10.1093/aob/mci083>
97. Xu, Y., Zhang, Y., Li, Y., Li, G., Liu, D., Zhao, M., & Cai, N. (n.d.). Growth Promotion of Yunnan Pine Early Seedlings in Response to Foliar Application of IAA and IBA. *International Journal of Molecular Sciences*, 13(5), 6507–6520. <https://www.doi.org/10.3390/ijms13056507>
98. Yang, T., Law, D. M., & Davies, P. J. (n.d.). Magnitude and Kinetics of Stem Elongation Induced by Exogenous Indole-3-Acetic Acid in Intact Light-Grown Pea Seedlings. *Plant Physiology*, 102(3), 717–724. <https://www.doi.org/10.1104/pp.102.3.717>
99. Yin, R., Li, L., & Zuo, K. (n.d.). *Plant Photomorphogenesis*. <https://www.doi.org/10.1007/978-1-0716-1370-2>
100. Žádníková, P., Smet, D., Zhu, Q., Straeten, D. V. D., & Benková, E. (n.d.). Strategies of seedlings to overcome their sessile nature: auxin in mobility control. *Frontiers in Plant Science*, 6. <https://www.doi.org/10.3389/fpls.2015.00218>
101. Zhao, S., Zhang, Q., Liu, M., Zhou, H., Ma, C., & Wang, P. (n.d.). Regulation of Plant Responses to Salt Stress. *International Journal of Molecular Sciences*, 22(9), 4609–4609. <https://www.doi.org/10.3390/ijms22094609>
102. Zhou, J.-J., & Luo, J. (n.d.). The PIN-FORMED Auxin Efflux Carriers in Plants. *International Journal of Molecular Sciences*, 19(9), 2759–2759. <https://www.doi.org/10.3390/ijms19092759>
103. Zhu, J.-K. (n.d.). Abiotic Stress Signaling and Responses in Plants. *Cell*, 167(2), 313–324. <https://www.doi.org/10.1016/j.cell.2016.08.029>
104. Zimmerman, B. K., & Briggs, W. R. (n.d.). Phototropic Dosage-Response Curves for Oat Coleoptiles. *Plant Physiology*, 38(3), 248–253. <https://www.doi.org/10.1104/pp.38.3.248>